



BLAISE PASCAL
PT 2023-2024

Fiche outil

Équations différentielles

Extrait du programme officiel de PTSI : appendice 2 « Outils mathématiques », bloc 2 « Équations différentielles ».

Notions et contenus	Capacités exigibles
<p>Équations différentielles linéaires à coefficients constants.</p> <p>Équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients constants : $y' + ay = f(t)$.</p> <p>Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants : $y'' + ay' + by = f(t)$.</p>	<p>Identifier l'ordre. Mettre l'équation sous forme canonique.</p> <p>Trouver la solution générale de l'équation sans second membre (équation homogène).</p> <p>Trouver l'expression des solutions lorsque $f(t)$ est constante ou de la forme $A \cos(\omega t + \varphi)$ en utilisant la notation complexe.</p> <p>Utiliser l'équation caractéristique pour trouver la solution générale de l'équation sans second membre.</p> <p>Prévoir le caractère borné ou non de ses solutions (critère de stabilité).</p> <p>Trouver l'expression des solutions lorsque $f(t)$ est constante ou de la forme $A e^{\lambda t}$ avec λ complexe.</p> <p>Trouver la solution de l'équation complète correspondant à des conditions initiales données.</p> <p>Représenter graphiquement cette solution.</p>
<p>Autres équations différentielles d'ordre 1 ou 2.</p>	<p>Obtenir une intégrale première d'une équation de Newton $\ddot{x} = f(x)$ et l'exploiter graphiquement.</p> <p>Séparer les variables d'une équation du premier ordre à variables séparables.</p> <p>Faire le lien entre les conditions initiales et le graphe de la solution correspondante.</p>

En **gras**, les points devant faire l'objet d'une approche expérimentale.

Équation différentielle linéaire à coeffs constants ?
 La grandeur cherchée u , ses dérivées, et un forçage $f(t)$.
 Pas de carré, sinus, etc., ni de coeff dépendant du temps

Mise sous forme canonique :
 Préfacteur 1 devant la dérivée la plus élevée,
 Paramètres caractéristiques : τ, ω_0, Q , etc.

Solution particulière u_p :
 Décrit le régime permanent donc de même type que le forçage.
 Se trouve directement sur l'équation différentielle.

Solution homogène u_h :
 Décrit le régime transitoire.
 Connue par cœur à partir de la forme canonique.

Détermination des constantes :
 Identification de la solution (et sa dérivée si ordre 2) avec les conditions initiales. Le nombre de conditions initiales nécessaires est égal à l'ordre de l'équation.
 ⚠️⚠️⚠️ Attention les constantes se déterminent sur la solution complète.

$$\frac{du}{dt} + \frac{1}{\tau} u = f(t)$$

$$A e^{-t/\tau}$$

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \omega_0^2 u = f(t)$$

$$A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = U_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\frac{d^2u}{dt^2} - \frac{1}{\tau^2} u = f(t)$$

$$A e^{-t/\tau} + B e^{+t/\tau}$$

(se trouve par le polynôme caractéristique)

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \omega_0 \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = f(t)$$

Discriminant du polynôme caractéristique

$$\Delta < 0 \Rightarrow [A \cos(\omega_p t) + B \sin(\omega_p t)] e^{-\mu t}$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow (A + Bt) e^{r t}$$

$$\Delta > 0 \Rightarrow A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}$$

(s'applique aussi si coefficients constants, mais rarement utile)

Équation différentielle non-linéaire ou à coefficients variables ?

si ordre 1

autres cas

pas de méthode à connaître, suivre l'énoncé.

Séparation des variables :
 À gauche ce qui dépend de u , à droite ce qui dépend de t ,
 Souvent pratique de mettre les constantes avec t ;
 Intégration et calcul de la primitive.
 ⚠️⚠️⚠️ Attention aux bornes d'intégration :
 côté gauche de $u(0)$ à $u(t)$, côté droit de 0 à t .

Conditions initiales à déterminer au préalable car elles interviennent dans les bornes de l'intégrale.